



COMO PROLONGAR A PERSISTENCIA ?

Graças ao constante progresso genético e ao aprimoramento no manejo e na qualidade da alimentação, os produtores de ovos agora podem prolongar a produtividade dos lotes comerciais. Em vez de induzir a muda nas aves (o que nem sempre é uma solução econômica), maximizar a persistência na produção tornou-se um objetivo primário para muitas granjas.

PONTO DE VISTA GENÉTICO

A seleção voltada para a persistência é um dos principais critérios do programa genético da Novogen. Através de nosso extenso programa de P&D com ciclos de produção de 100 semanas, a persistência da produção tem aumentado geração após geração em todos os produtos Novogen. Como resultado, um maior número de aves agora é capaz de produzir um ovo por dia por um longo período.

ORIGEM

Muitos fatores podem afetar negativamente a produção de ovos. Portanto, é crucial prestar atenção especial ao período de recria, profilaxia e manejo ao longo de toda a vida da ave para maximizar a expressão do potencial genético.

MEDIDAS A SEREM TOMADAS

- Densidade de alojamento e equipamentos na recria e na produção
- Peso Corporal (P.C.) e uniformidade na recria/produção, na maturidade sexual e na transferência
- Observar as aves diariamente (comportamento, cobertura de penas, qualidade das fezes, etc.)
- Distribuição de ração (tempo, quantidade, etc.)
- Consumo de água, qualidade, temperatura, cloração...
- Temperatura, ventilação, amônia
- Intensidade e cor da luz


IMPACTOS DE MANEJO

O Peso Corporal e a Uniformidade são critérios fundamentais para melhorar a persistência. O período de produção é um ciclo longo, e a estrutura corporal e as reservas no início da produção são vitais para maximizar a persistência.

Um programa de iluminação adaptado é útil para garantir a adequação entre maturidade sexual e peso corporal.

- Certifique-se de que o programa de iluminação esteja ajustado ao comprimento do dia natural quando as aves começarem a produção. Um peso corporal muito baixo ao primeiro ovo terá um efeito adverso na persistência.

Resultados internos - NOVOgen BROWN
Ovo/Ave/ alojado com 90 semanas



NOVOFOCUS

- Utilize 15 horas de luz a partir do pico de produção até no máximo 40 semanas de idade; considere adicionar uma hora extra para atingir 16 horas quando o lote estiver entre 40 e 45 semanas de idade

Incentive o consumo de ração, Forneça ração suficiente para estimular a produção de ovos; por outro lado, a insuficiência de ração impactará negativamente a persistência..

- Nunca restrinja as aves (rações menos concentradas é melhor).
- Garanta um consumo equilibrado de ração mantendo os comedouros vazios diariamente (consumo de partículas grandes e pequenas).

Pese as aves semanalmente no início da produção e regularmente após o pico, qualquer diminuição do peso corporal durante a produção influenciará tanto a produção quanto a persistência. É importante lembrar que uma galinha poedeira nunca deve perder peso.

- Forneça ração suficiente (quantidade & qualidade)

O consumo de ração pode ser melhorado fornecendo água de qualidade. No entanto, uma má qualidade da água pode resultar em baixo consumo de ração, problemas sanitários ou fezes úmidas. ...

- Avalie a qualidade da água pelo menos anualmente.
- Utilize cloração.
- Forneça água em quantidade e qualidade suficientes.
- Forneça sempre água fresca para climas quentes.

NUTRIÇÃO

O manejo da alimentação durante o período de produção é fundamental. Qualquer deficiência pode comprometer o potencial produtivo do lote. Lembre-se de que algumas aves mantêm uma produção de 100% durante toda a vida. A qualidade da ração é essencial para manter as aves em produção até as 100 semanas de idade.

Recomendações:

- Boa digestibilidade das matérias-primas (sem fatores antinutricionais).
- Boa apresentação da ração (homogeneidade) e transição suave entre diferentes tipos de ração.
- Ausência de micotoxinas ou substâncias indesejáveis (por exemplo, adicionar um adsorvente de micotoxinas em caso de risco).

Premix and aditivos pode ajudar a manter as aves em boas condições.

- Forneça vitaminas e microelementos suficientes (consulte o nosso Guia de Nutrição).
- Utilize os melhores para as suas condições locais.

Saúde intestinal e estado do fígado, aves de ciclo longo exigem uma boa e um fígado saudável. Afinal, uma galinha poedeira coloca diariamente dentro de um ovo equivalente a 3% do seu peso corporal.

- Betaine, Choline, Vitamins could help. A cure with a liver protector is recommended, regularly.
- Some additives

As fibras contribuem para manter uma boa saúde intestinal (e comportamento) e para controlar o peso corporal das aves. Aves gordas ao final do ciclo de postura podem apresentar baixa persistência.

- Mínimo de 3,5% para sistemas em gaiolas.
- Mais de 3,5% para todos os sistemas livres de gaiolas.

Mais fibras significa menos energia, o que ajudará a manejar melhor o peso corporal e controlar o excesso de gordura abdominal.

SANITÁRIO

A Qualquer desafio sanitário pode comprometer a taxa de produção. As aves precisam de tempo para se recuperar (se conseguirem se recuperar).

- Siga rigorosamente as medidas de biossegurança.
- Utilize um programa de vacinação ajustado às condições sanitárias locais e evite aplicar vacinas durante o início da postura.
- Tome ações o mais rápido possível em caso de qualquer sinal de infecção (diminuição da ingestão de água, consumo de ração, etc.)

CONCLUSION

A persistência de produção ideal começa a ser construída já nos períodos de recria e pré-postura. Para maximizar a qualidade da produção, é essencial antecipar e atender às necessidades das poedeiras ao longo de todo o ciclo produtivo.

Para mais informações, consulte nosso site, onde estão disponíveis o guia de nutrição, todos os guias de manejo, e o nosso NovoCenter.

