



LA PRATIQUE DU VIDE MANGEOIRE

La pratique du vide mangeoire consiste à encourager les poulettes et les poules pondeuses à manger quotidiennement toutes les particules fines pour atteindre un bon indice de consommation (IC). En revanche, la pratique ad libitum, où l'aliment est disponible à tout moment, n'est recommandée que pour les jeunes poulettes, c'est-à-dire avant l'âge de 4 ou 5 semaines. Après cette période et tout au long du cycle de production, la pratique du vide mangeoire devrait être bénéfique. Une bonne consommation d'aliments permettra une bonne production, un bon poids d'œuf et une bonne qualité de coquille d'œuf. En outre, le moment et la durée du vide mangeoire sont également cruciaux.

POINT DE VUE GÉNÉTIQUE

Nous nous attachons à sélectionner des poules plus efficaces, en particulier celles qui présentent le meilleur indice de consommation (IC). La gestion de la consommation d'aliments peut parfois s'avérer difficile, mais nous nous efforçons de maintenir une consommation d'aliments constante chez nos pondeuses, afin d'assurer la stabilité d'une génération à l'autre.


ORIGINE

L'intérêt de cette pratique est d'encourager les poulettes et les poules pondeuses à manger davantage et de veiller à ce que leur alimentation soit équilibrée sur le plan nutritionnel. Les poules pondeuses ont tendance à préférer les grosses particules, si vous leur donnez le choix, elles ne mangeront jamais les particules fines. Cependant, les particules plus fines contiennent des vitamines essentielles, des micro-éléments et des minéraux qui sont des nutriments cruciaux pour soutenir une production élevée. Il est important de gérer l'alimentation de manière à ce que toutes les poules consomment à la fois les grandes et les petites particules afin d'obtenir une persistance et une qualité de coquille d'œuf optimales.

MESURES À EFFECTUER

- La consommation d'aliments par poule et par jour doit être bonne ; 65 % ou plus de la ration alimentaire quotidienne doit être distribuée à la fin de la journée.
- Consommation d'eau (quantité et période)

External RST results - NOVOgen BROWN
Feed conversion ratio



- Moment où la mangeoire est vide :
 - Elle doit être vide à la mi-journée (ou aux heures les plus chaudes sous un climat tropical). Jamais à l'allumage des lumières le matin (pour satisfaire la faim naturelle des poules), et jamais en fin de journée (sinon, la qualité de coquille d'œuf se dégrade).
- Durée du vide de la mangeoire :
 - 1 heure pour les lignées Leghorn (œufs blancs) est suffisante, plus peut parfois signifier une restriction de l'alimentation.
 - Elle peut être de 2 ou 3 heures (parfois plus) pour les lignées Rhode Island (œufs bruns).



IMPACT DU MANAGEMENT

La pratique du vide de mangeoire est fortement liée à l'équipement d'alimentation :

- Chaîne plate
 - La chaîne doit tourner aussi vite que possible pour éviter la consommation sélective des grosses particules.
 - Elle peut également fonctionner pendant la période d'obscurité, en cas de bâtiment sombre.
- Assiette
 - La gestion de la hauteur d'alimentation est plus compliquée que dans le cas de la chaîne. Elle est souvent liée au niveau à la fin de la ligne d'alimentation (capteur dans la dernière assiette).
 - Le niveau d'alimentation doit être suivi de manière plus stricte et ajusté plus régulièrement que dans le cas de la chaîne plate.
- Charriots pour les systèmes cages
 - Vérifiez que tous les niveaux reçoivent la même quantité et la même qualité d'aliments. Le niveau supérieur est souvent négligé car il n'est pas facile à contrôler.
 - Une mauvaise distribution de l'aliment peut entraîner une faible uniformité du poids brut et, parfois, des restrictions pour les poules.

Veillez à ce que l'équipement du poulailler soit adapté à l'âge des poules. Dans le cas contraire, la concurrence pour l'alimentation peut compliquer la pratique du vide mangeoire.

- Une densité élevée peut accroître la concurrence pour l'accès à la mangeoire, ce qui se traduit par une faible uniformité du poids corporel. Les poules les plus grosses peuvent consommer les grosses particules et devenir trop grasse, tandis que les poules plus petites peuvent avoir du mal à finir les fines particules, ce qui entraîne une restriction. Cela rend la pratique du vide mangeoire plus difficile.

La pratique de la mangeoire vide devrait commencer dès que possible pendant la période d'élevage.

Recommandations de densité des mangeoires en élevage

	De 1 jours à 2 semaines	De 2 à 5 semaines	De 6 semaines au transfert
Mangeoires de démarrage	1 / 50 poulettes	-	
Chaîne plate	2.5 cm / poulette	4 cm / poulette	6 cm / poulette
Assiettes	1 / 30 poulettes	1 / 25 poulettes	1 / 25 poulettes

- Idéalement, cela se fait à l'âge de 4 semaines, si le poids corporel est bon, souvent plus tard dans des conditions difficiles, en particulier dans les zones tropicales.
- Cette pratique doit être maintenue jusqu'à la réforme
- Le vide mangeoire signifie que les poulettes ou les poules pondeuses doivent finir tout l'aliment par elles-mêmes. Il n'est pas recommandé de retirer manuellement l'aliment de la mangeoire, car cela n'est pas considéré comme une mangeoire vide.

Combien de vide mangeoire par jour ? Quand ?

- UN SEUL, pas plus.
- À midi ou en début d'après-midi. Jamais au moment d'allumer les lumières et à la fin de la journée.

Pour réduire la compétition à la mangeoire, utilisez le moins possible de distribution d'aliment par jour. Vous trouverez ci-dessous un exemple de programme d'alimentation pour l'élevage. Dans des conditions chaudes, il est possible d'utiliser un éclairage nocturne pour donner de la nourriture aux poules pendant les heures les plus fraîches de la journée.

CONCLUSION

Cette pratique est sûrement le meilleur outil pour améliorer et atteindre une bonne consommation d'aliment pour toutes les souches de pondeuses. Les poulettes et les pondeuses n'aiment pas manger (c'est l'inverse des poulets de chair), il est important de les aider. Mais si pour certain une mangeoire vide signifie que les oiseaux mangent moins, cela n'est pas vrai, c'est l'opposé. Un vide mangeoire bien géré permet d'atteindre de bonnes performances et une meilleure rentabilité.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet avec le guide nutrition et tous les guides

