



COMMENT CONTRÔLER LE PICAGE CLOACAL ?

Avec le développement des systèmes de production alternatifs, le picage cloacal est un défi pour certains éleveurs. Ce comportement est principalement lié à des facteurs environnementaux. Il doit être évité et maîtrisé dès le plus jeune âge. Les systèmes alternatifs sont plus sensibles au picage cloacal que les cages enrichies ou traditionnelles. Cela s'explique en grande partie à cause du nombre plus élevée d'animaux pouvant interagir dans un même espace et par la difficulté à contrôler certains facteurs environnementaux.

POINT DE VUE GÉNÉTIQUE

Depuis 2008, le comportement des poules est au cœur du programme de recherche et développement de Novogen. L'objectif est d'assurer une bonne adaptation de nos animaux à des environnements variés. Nos lignées pures sont élevées dans des conditions proches de celles que connaîtront leurs descendants (pondeuses commerciales). Un mélange de cages enrichies et de système de sélection au sol permet d'identifier les poules les plus aptes à s'adapter à différents environnements. Les excellentes performances des produits Novogen dans les systèmes alternatifs ou en conditions difficiles résultent directement de ce programme mis en place depuis plusieurs années.

ORIGINE

L'origine du picage est multifactorielle et souvent difficile à identifier. La conduite d'élevage, la nutrition, la santé, ou encore la génétique peuvent tous jouer un rôle. Une pondeuse dont le cloaque tarde à revenir à son état normal après la ponte risque d'être agressée, voire tuée, en quelques heures. Il en va de même pour une pondeuse présentant une blessure avec du sang visible. Sur le plan nutritionnel, une carence ou un excès de certains nutriments peut également inciter les animaux à se piquer entre eux. En réalité, tout nouveau facteur de stress peut suffire à déclencher un épisode de picage.

MESURES À EFFECTUER

- Contrôler l'état corporelle et l'apport énergétique (par poule et par jour).

- Vérifier les apports en Calcium, Phosphore, Sodium et Chlore.
- Vérifier l'intensité, l'uniformité et la fluctuation de la lumière.
- Détecter les maladies, parasites internes et externes.
- Observer sans bouger pendant 10 minutes dans le bâtiment pour analyser les comportements des animaux.
- Repérer la présence d'œufs avec du sang sur la coquille.

IMPACTS DU MANAGEMENT

Comment réagir rapidement face à du picage cloacal en bâtiment obscur ?

Introduire une période d'obscurité en cours de journée.

- Après le pic de ponte (environ 7h après l'allumage des lumières), une ou deux heures suffisent généralement pour permettre au cloaque de se rétracter correctement. Cette mesure simple peut éviter de nombreuses agressions et sauver un grand nombre d'animaux, en attendant d'identifier et de traiter la cause du picage.

Absence d'animaux blessés au sein du lot.

Une poule « différente » (blessure, couleur...) est plus susceptible d'être agressée par ses congénères

- Mettez en place un espace « infirmerie », pour isoler les individus blessés dans un environnement sécurisé, avec un accès facile à l'eau et à l'alimentation.
- En cas de signes de picage, augmentez la fréquence des visites. Cela permet de séparer les animaux touchés plus rapidement et de limiter la propagation du comportement agressif.



Gestion de l'intensité et de la qualité lumineuse.

Une intensité lumineuse trop élevée peut provoquer de la nervosité, notamment dans les bâtiments obscurs. De plus, un éclairage mal réparti crée des zones défavorables pour les animaux. L'utilisation d'un luxmètre est essentielle pour vérifier l'homogénéité et l'intensité de la lumière. Il faut également être vigilant au scintillement ou aux fluctuations lumineuses, surtout avec certains systèmes LED à faible intensité. Bien que souvent imperceptibles à l'œil humain, ces variations peuvent constituer une source de stress pour les animaux.

- Réduire, si possible, l'intensité lumineuse.
- Changer la couleur de la lumière. Les nouveaux systèmes LED permettent souvent de passer facilement d'une lumière blanche à une lumière rouge ou verte.

- La lumière verte est reconnue pour apaiser les oiseaux.

La lumière rouge masque le sang visible sur les blessures, ce qui aide à réduire le risque de picage.



Bâtiment équipé d'un éclairage à lumière verte

Observez le comportement des poules et stimulez-les.

L'observation quotidienne du comportement des oiseaux est le meilleur moyen de détecter les premiers signes de stress ou d'agressivité. Plusieurs techniques permettent d'occuper les oiseaux et de réduire leur nervosité :

- Pierres à picorer : différentes duretés disponibles, elles permettent d'occuper les animaux.
- Boules de luzerne : les animaux en manque de fibres chercheront à en consommer dans leur environnement. Proposez des boules suffisamment compactes pour éviter qu'elles ne disparaissent trop vite. La consommation recommandée est d'environ 1 g par poule/jour.
- Jouets : balles, seaux, pierres ou autres objets peuvent divertir les animaux. Cependant, leur effet est temporaire, après quelques jours (une semaine maximum), les poules se désintéressent. Il est donc essentiel de renouveler régulièrement ces objets pour maintenir leur efficacité.

IMPACTS NUTRITIONNELS

Apport énergétique excessif.

Un excès d'énergie dans l'alimentation peut entraîner un engraissement des poules. Les individus trop gras présentent un retrait du cloaque plus lent, ce qui augmente le risque d'agressions.

- Réduire l'apport énergétique.
- Échangez régulièrement avec votre nutritionniste local afin d'adapter le niveau d'énergie en fonction de l'état corporel et des besoins réels des poules.

Carence en Calcium et Phosphore.

Une carence en Calcium ou Phosphore peut favoriser l'apparition de comportements de picage, tout en dégradant la qualité de la coquille. Ces deux minéraux jouent un rôle essentiel dans la contraction musculaire.

Carence en Sodium.

Un déficit en sodium, et parfois en chlore, peut réduire la consommation alimentaire et provoquer une nervosité générale au sein du troupeau. Ce stress peut provoquer des comportements de picage, utilisés par les animaux comme mécanisme de compensation.

Apport en fibres.

Les bénéfices sont significatifs, notamment pour prévenir et réduire tous les types de picage.

- Favorise la satiété, ce qui apaise les animaux.
- Augmente le temps passé à s'alimenter et ainsi, limite le risque d'agression ou de picage.
- Des fientes plus sèches contribuent à une litière plus sèche, créant un meilleur environnement et améliorant le comportement des oiseaux.

IMPACTS SANITAIRES

Certains problèmes sanitaires contribuent indirectement à l'apparition du picage du cloaque. L'entérite et le syndrome de la chute de ponte (EDS) sont fréquents chez les individus affectés. Un contrôle sanitaire rigoureux est donc essentiel pour limiter ce risque. Pensez à vérifier régulièrement l'état de santé du troupeau avec votre vétérinaire.

CONCLUSION

Les systèmes alternatifs demandent aux éleveurs de consacrer davantage de temps à l'observation et au suivi du comportement des oiseaux. Un retour aux fondamentaux est essentiel. Tout comportement problématique doit être identifié et corrigé rapidement, sous peine de devenir difficile à maîtriser. La nutrition et la conduite d'élevage jouent un rôle clé dans la prévention et la résolution de ce comportement, mais elles ne sauraient se substituer à l'attention et à l'expérience de l'éleveur.

Pour en savoir plus, consultez notre site web où vous trouverez notre guide de nutrition, nos guides d'élevage, ainsi que notre NovoCenter.